

成都七中高 2023 届三诊模拟考试数学 (理科)

一.选择题 (本题共 12 小题, 每小题 5 分, 共 60 分, 在每小题给出的四个选项中, 只有一个是符合题目要求的, 请将选项填涂在答题卡上)

1. 已知集合 $A = \{x | |x-3| < 2\}$, $B = \left\{x \left| \frac{x+1}{x-2} \leq 0\right.\right\}$, 则 $A \cup B = (\quad)$

- A. $(1, 2]$ B. $(1, 2)$ C. $[-1, 5]$ D. $[-1, 5)$



2. 已知复数 z 满足 $(2+3i)z = 1+i$ (i 为虚数单位), 则在复平面内复数 z 对应的点位于 ()

- A. 第四象限 B. 第三象限 C. 第二象限 D. 第一象限

3. 命题“有一个偶数是素数”的否定是 ()

- A. 任意一个奇数是素数 B. 任意一个偶数都不是素数
C. 存在一个奇数不是素数 D. 存在一个偶数不是素数

4. 三棱锥 $P-ABC$ 的底面 ABC 为直角三角形, ΔABC 的外接圆为圆 O , $PQ \perp$ 底面 ABC , Q 在圆 O 上或内部, 现将三棱锥的底面 ABC 放置在水平面上, 则三棱锥 $P-ABC$ 的俯视图不可能是 ()



5. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} f(x+1), & x \leq 0 \\ x^2 - 3x - 4, & x > 0 \end{cases}$, 则 $f(f(-4)) = (\quad)$

- A. -6 B. 0 C. 4 D. 6

6. 已知实数 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} 2x+y-2 \geq 0 \\ x-2y-2 \leq 0, \\ y \leq 1 \end{cases}$, 则 $\frac{x+y}{x}$ 的最大值是 ()

- A. 2 B. $\frac{8}{3}$ C. 3 D. 4

7. 中国古代许多著名数学家对推导高阶等差数列的求和公式很感兴趣, 创造并发展了名为“垛积术”的算法, 展现了聪明才智. 南宋数学家杨辉在《详解九章算法》和《算法通变本末》中, 所讨论的二阶等差数列与一般等差数列不同, 前后两项之差并不相等, 但是后项减前项之差组成的新数列是等差数列. 现有一个“堆垛”, 共 50 层, 第一层 2 个小球, 第二层 5 个小球, 第三层 10 个小球, 第四层 17 个小球, …, 按此规律, 则第 50 层小球的个数为 ()

- A. 2400 B. 2401 C. 2500 D. 2501

8. 瑞士数学家欧拉发现了复指数函数和三角函数的关系, 并写出以下公式 $e^{ix} = \cos x + i \sin x$

($x \in \mathbb{R}$, i 为虚数单位), 这个公式在复变论中占有非常重要的地位, 被誉为“数学中的天桥”. 根据此公式, 下面四个结果中不成立的是 ()

- A. $e^{i\pi} + 1 = 0$ B. $\left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right)^{2022} = 1$
C. $|e^{ix} + e^{-ix}| \leq 2$ D. $-2 \leq e^{ix} - e^{-ix} \leq 2$

9. 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 D , 若对任意的 $x \in D$, 都存在 $x_0 \in D$, 使得 $x + f(x_0) = 1$, 则“ $f(x)$ 存在零点”是“ $1 \in D$ ”的()


- A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充分且必要条件 D. 既不充分也不必要条件

10. 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左焦点为 F_1 , 直线 $y = kx (k > 0)$ 与双曲线 C 交于 P, Q

两点, 且 $\angle PF_1Q = \frac{2\pi}{3}$, $\overrightarrow{PF_1} \cdot \overrightarrow{F_1Q} = 4$, 则当 $\frac{1}{2}a^2 + \frac{b^2}{a^2}$ 取得最小值时, 双曲线 C 的离心率为()

- A. 3 B. $\sqrt{3}$ C. $\sqrt{2}$ D. 2

11. 如图, 矩形 $ABCD$ 中, $AB = 2AD = 2\sqrt{2}$, E 为边 AB 的中点, 将 $\triangle ADE$ 沿直线 DE 翻折成 $\triangle A_1DE$. 在翻折过程中, 直线 A_1C 与平面 $ABCD$ 所成角的正弦值最大为()



- A. $\frac{\sqrt{6}}{6}$ B. $\frac{\sqrt{10}-\sqrt{2}}{4}$ C. $\frac{\sqrt{5}-1}{4}$ D. $\frac{\sqrt{5}}{5}$

12. 函数 $g(x)$ 与其导函数为 $g'(x)$, 满足 $(x + \frac{1}{x}) \cdot g'(x) < (1 - \frac{1}{x^2}) \cdot g(x)$, 其中 $x > 0$;

若 $m = \tan\theta$, $n = \sin\theta + \cos\theta$, 其中 $0 < \theta < \frac{\pi}{4}$, 则下列不等式一定成立的有()个

- ① $g(1) - g(m) < 0$; ② $g(1) - (n^2 - 1)g(m) > 0$
③ $(\sin 2\theta + 2)g(1) - 2ng(n) > 0$ ④ $(n^4 - 1)g(m) - 2ng(n) < 0$:

- A 1 B 2 C 3 D 4

二. 填空题 (本题共 4 个小题, 每小题 5 分, 共 20 分, 请将答案填在答题卡指定横线上)

13. 已知 $\vec{a} = (4, 2)$, $\vec{b} = (-1, 1)$, 则 \vec{a} 在 \vec{b} 方向上的投影为_____.

14. 2023 年五一节到来之前, 某市物价部门对本市 5 家商场的某种商品一天的销售量及其价格进行调查, 5 家商场这种商品的售价 x (单位: 元) 与销售量 y (单位: 件) 之间的一组数据如下表所示:

价格 x	8	9.5	m	10.5	12
销售量 y	16	10	8	6	5

经分析知, 销售量 y 件与价格 x 元之间有较强的线性关系, 其线性回归直线方程为 $\hat{y} = -3.5x + 44$, 则 $m =$ _____.

15. 在数列 $\{a_n\}$ 中, $a_{n+1}^2 + a_n^2 + 1 = 2(a_{n+1}a_n + a_{n+1} + a_n)$, 且 $a_1 = 1$, $\{a_n\}$ 递增, 则 $a_n =$ _____.


16. 抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点为 F , 直线 l 的方程为: $x = ty + 7$, l 交抛物线于 M, N 两点, 且 $\overrightarrow{MF} \cdot \overrightarrow{NF} = 0$, 抛物线在 M, N 处的切线交于点 P , 则 ΔPMN 的面积为_____.

三. 解答题 (本大题共 7 小题, 17-21 题各 12 分, 22 或 23 题 10 分. 解答过程应写出文字说明、证明过程或演算步骤, 请作答在答题卡上)

17. 如图, ΔABC 是边长为 2 的正三角形, P 在平面上且满足 $CP=CA$, 记 $\angle CAP=\theta$.

(1)若 $\theta=\frac{\pi}{3}$, 求 PB 的长;


(2)用 θ 表示 $S_{\Delta PAB}$, 并求 $S_{\Delta PAB}$ 的取值范围.




18. 平面图形同 17 题. ΔABC 是边长为 2 的正三角形, P 在平面上满足 $CP=CA$, 将 ΔACP 沿 AC 翻折, 使点 P 到达 P' 的位置, 若平面 $P'BC \perp$ 平面 ABC , 且 $BC \perp P'A$.

(1)作平面 α , 使得 $AP' \subset \alpha$, 且 $BC \perp \alpha$, 说明作图方法并证明;

(2)点 M 满足 $\overrightarrow{MC} = 2\overrightarrow{P'M}$, 求二面角 $P'-AB-M$ 的余弦值.



19. 2023 年 4 月 12 日是成都七中 118 周年校庆. 为了纪念这一特殊的日子, 两校区学生会在全校学生中开展了校庆知识测试 (满分 100 分), 随机抽取了 100 名学生的测试成绩, 按照 $[60,70)$, $[70,80)$, $[80,90)$, $[90,100]$ 分组, 得到如下所示的样本频率分布直方图:



(1)根据频率分布直方图, 估计该校学生测试成绩的中位数;

(2)用样本的频率估计概率, 从该校所有学生中随机抽取 10 名学生的成绩, 用 $P(X=k)$ 表示这 10 名学生中恰有 k 名学生的成绩在 $[90,100]$ 上的概率, 求 $P(X=k)$ 取最大值时对应的 k 的值;

(3)从测试成绩在 $[90,100]$ 的同学中再次选拔进入复赛的选手, 一共有 6 道题, 从中随机挑选出 4 道题进行测试, 至少答对 3 道题者才可以进入复赛. 现有甲、乙两人参加选拔, 在这 6 道题中甲能答对 4 道, 乙能答对 3 道, 且甲、乙两人各题是否答对相互独立. 记甲、乙两人中进入复赛的人数为 ξ , 求 ξ 的分布列及期望.

20. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$, F_1, F_2 为 C 的左右焦点. 点 $P(1, -\frac{3}{2})$ 为椭圆上一点, 且 $|PF_1| + |PF_2| = 4$. 作 P 作两直线与椭圆 C 相交于相异的两点 A, B , 直线 PA, PB 的倾斜角互补, 直线 AB 与 x, y 轴正半轴相交.
- (1) 求椭圆 C 的方程;
 - (2) 点 M 满足 $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{MB}$, 求 M 的轨迹方程.

21. 已知函数 $f(x) = \cos x + \frac{a}{2}x^2 - 1$, $a \in R$.

(1) 若 $x=0$ 是函数 $f(x)$ 唯一的极小值点, 求实数 a 的取值范围;

(2) 证明: $\sqrt{\sin^3 \frac{1}{2}} + \sqrt{\sin^3 \frac{2}{4}} + \sqrt{\sin^3 \frac{3}{8}} + \dots + \sqrt{\sin^3 \frac{2023}{2^{2023}}} < 2$.

请考生在第 22、23 题中任选一题作答, 如果多做, 则按所做的第一个题目计分. 请考生用 2B 铅笔将答题卡上所做题目的题号涂黑.

22. 在平面直角坐标系 xOy 中, 曲线 C 的参数方程为 $\begin{cases} x = 1 + \frac{2 \sin^2 \alpha}{\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha}, \\ y = \frac{\sqrt{2} \sin \alpha \cos \alpha}{\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha} \end{cases}$ (α 为参数), 以坐标原点为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 直线 l 的极坐标方程为 $\theta = \frac{\pi}{6} (\rho \in R)$.

(1) 求 C 的普通方程与 l 的直角坐标方程;

(2) 求 l 与 C 交点的极坐标.

23. 已知函数 $f(x) = \frac{1}{3}|x-a| (a \in R)$.

(1) 当 $a=2$ 时, 解不等式 $\left|x - \frac{1}{3}\right| + f(x) \geq 1$;

(2) 设不等式 $\left|x - \frac{1}{3}\right| + f(x) \leq x$ 的解集为 M , 若 $\left[\frac{1}{3}, \frac{1}{2}\right] \subseteq M$, 求实数 a 的取值范围.