

南充市高 2023 届“三诊”理科数学参考答案

一、选择题：本题共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分，在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求.

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
选项	D	C	B	B	A	C	A	D	C	C	B	D

二. 填空题: 本大题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分. 把答案填在答题卡上.

13. 60 14. 1400 15. $\frac{13}{4}$

16. ①③④

三、解答题：共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。第 17—21 题必考题，每个试题考生必须作答。

第 22、23 题为选考题，考试根据要求作答。

(一)必考题

$$17. \text{ 解: (1)} \because 2S_n = 3a_n - 3 \dots \dots \dots \textcircled{1}$$

∴当 $n \geq 2$ 时, $2S_{n-1} = 3a_{n-1} - 3$ ………② (2分)

①-②得: $2a_n = 3a_n - 3a_{n-1}$, 即 $a_n = 3a_{n-1}$ ($n \geq 2$)

$$\therefore a_1 = 3 \quad \dots \quad (3 \text{ 分})$$

∴数列 $\{a_n\}$ 以3为首项,3为公比的等比数列.

$$\therefore a_n = 3^n \quad (n \in N^*) \quad (6 \text{ 分})$$

$$(2) \because b_n = a_n + \log_3 a_n = 3^n + n. \quad (7 \text{ 分})$$

$$\begin{aligned} \therefore T_n &= b_1 + b_2 + \cdots + b_{n-1} + b_n = (3^1 + 1) + (3^2 + 2) + \cdots + (3^{n-1} + n - 1) + (3^n + n) \\ &= (3^1 + 3^2 + \cdots + 3^{n-1} + 3^n) + (1 + 2 + \cdots + n - 1 + n) \\ &= \frac{3(1 - 3^n)}{1 - 3} + \frac{(1 + n)n}{2} = \frac{3^{n+1} + n^2 + n - 3}{2}. \end{aligned}$$

所以 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 $T_n = \frac{3^{n+1} + n^2 + n - 3}{2}$ (12 分)

18. 解: (1) 由 $\bar{x} = \frac{2+3+4+5+6+8+9+11}{8} = 6$, $\bar{y} = \frac{1}{8} \sum_{i=1}^8 y_i = \frac{48.6}{8} = 6.075$ 得: (2 分)

$$\hat{b} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i y_i - n \bar{x} \bar{y}}{\sum_{i=1}^n x_i^2 - n \bar{x}^2} = \frac{334.1 - 8 \times 6 \times 6.075}{356 - 8 \times 36} = 0.625$$

由 $\hat{a} = \bar{y} - \hat{b}\bar{x}$ 得 $\hat{a} = 6.075 - 0.625 \times 6 = 2.325$

所以年收入的附加额 y 与投资额 x 的线性回归方程为 $\hat{y} = 0.625x + 2.325$ (6分)

(2)8个投资额中，收入附加额大于投资额的企业个数为5，

故 X 的所有可能取值为 0, 1, 2, 3..... (7 分)

$$P(X=0)=\frac{C_3^3}{C_8^3}=\frac{1}{56}, \quad P(X=1)=\frac{C_3^2 C_5^1}{C_8^3}=\frac{15}{56}, \quad P(X=2)=\frac{C_3^1 C_5^2}{C_8^3}=\frac{15}{28}, \quad P(X=3)=\frac{C_5^3}{C_8^3}=\frac{5}{28}.$$

则 X 的分布列为

X	0	1	2	3
P	$\frac{1}{56}$	$\frac{15}{56}$	$\frac{15}{28}$	$\frac{5}{28}$

$$\text{故 } E(X) = 1 \times \frac{15}{56} + 2 \times \frac{15}{28} + 3 \times \frac{5}{28} = \frac{15}{8} \quad (\text{12 分})$$

19. 证明: (1) 连接 MO 并延长交 AD 于 N (2 分)

$\because M$ 为劣弧 BC 的中点

$\therefore MO$ 是 $\angle BOC$ 的角平分线,

$\therefore MN$ 平分 $\angle AOD$

$\because OA = OD$

$\therefore MO \perp AD$ (4 分)

又 \because 在圆锥 SO 中, $SO \perp$ 平面 $ABCD$

$\therefore SO \perp AD$

$\because MO, SO \subset$ 平面 SMN , 且 $MO \cap SO = O$

$\therefore AD \perp$ 平面 SMO

又 $\because SM \subset$ 平面 SMO

故 $AD \perp SM$ (6 分)

(2) 以 O 为坐标原点, OA, OS 所在的直线分别为 x 轴,

z 轴, 以过 O 点且垂直 OA 的直线为 y 轴, 建立如图所示

空间直角坐标系 $O-xyz$.

故 $A(6,0,0), B(3,3\sqrt{3},0), M(-3,3\sqrt{3},0), D(-3,-3\sqrt{3},0)$

$S(0,0,6)$

$$\overrightarrow{DA} = (9, 3\sqrt{3}, 0), \overrightarrow{SA} = (6, 0, -6), \overrightarrow{MS} = (3, -3\sqrt{3}, 6)$$

$$\overrightarrow{BM} = (-6, 0, 0)$$



$$\text{设 } \overrightarrow{ME} = \lambda \overrightarrow{MS}, \text{ 故 } \overrightarrow{ME} = (3\lambda, -3\sqrt{3}\lambda, 6\lambda)$$

$$\therefore \overrightarrow{BE} = \overrightarrow{BM} + \overrightarrow{ME} = (-6 + 3\lambda, -3\sqrt{3}\lambda, 6\lambda)$$

$$\text{设平面 } SAD \text{ 的法向量为 } \vec{n} = (x, y, z), \text{ 由 } \begin{cases} \overrightarrow{DA} \cdot \vec{n} = 0 \\ \overrightarrow{SA} \cdot \vec{n} = 0 \end{cases} \text{ 得 } \begin{cases} 9x + 3\sqrt{3}y = 0 \\ 6x - 6z = 0 \end{cases}$$

$$\text{令 } z = 1 \text{ 得: 法向量 } \vec{n} = (1, -\sqrt{3}, 1) \quad (\text{8 分})$$

$$\therefore BE // \text{平面 } SAD$$



$$\therefore \overrightarrow{BE} \cdot \vec{n} = 0, \text{ 即 } -6 + 3\lambda + 9\lambda + 6\lambda = 0, \text{ 解得 } \lambda = \frac{1}{3}$$

$$\therefore \overrightarrow{ME} = (1, -\sqrt{3}, 2)$$


$$\text{又 } \therefore \overrightarrow{AM} = (-9, 3\sqrt{3}, 0)$$

$$\therefore \overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AM} + \overrightarrow{ME} = (-8, 2\sqrt{3}, 2) \quad \dots \quad (10 \text{ 分})$$

设 AE 与平面 SAD 所成角为 θ

$$\therefore \sin \theta = |\cos \langle \overrightarrow{AE} \cdot \vec{n} \rangle| = \frac{|-8 - 6 + 2|}{\sqrt{5} \sqrt{64 + 12 + 4}} = \frac{3}{5}$$

$$\text{即 } AE \text{ 与平面 } SAD \text{ 所成角的正弦值为 } \frac{3}{5}. \quad \dots \quad (12 \text{ 分})$$



注: 这里也可以先证明平面 $BCE // \text{平面 } SAD$. 得 $EF // SN$, 进而得 E 为 SM 的三等分点, 再建系证明即可.

20. 解析: (1)由题意易知, 动点 P 的轨迹是以 $M(-\sqrt{3}, 0), N(\sqrt{3}, 0)$ 为焦点的椭圆, 且 $2a=4$

$$\therefore \text{动点 } P \text{ 的轨迹 } C \text{ 的方程为: } \frac{x^2}{4} + y^2 = 1. \quad \dots \quad (4 \text{ 分})$$

(2) 显然直线 AD 的斜率存在, 设 AD 的方程为: $y = k(x+2)$

$$\text{联立} \begin{cases} \frac{x^2}{4} + y^2 = 1 \\ y = k(x+2) \end{cases} \text{ 得: } (4k^2 + 1)x^2 + 16kx + 4(4k^2 - 1) = 0$$

$$\text{由} -2x_1 = \frac{4(4k^2 - 1)}{4k^2 + 1} \text{ 得: } x_1 = \frac{2(1 - 4k^2)}{4k^2 + 1} \quad \therefore y_1 = k(x_1 + 2) = \frac{4k}{4k^2 + 1}$$

$$\therefore D\left(\frac{2(1 - 4k^2)}{4k^2 + 1}, \frac{4k}{4k^2 + 1}\right) \quad \dots \quad (6 \text{ 分})$$

由 $AD // BE$ 可设 BE 的方程为 $y = kx - 1$

$$\text{联立} \begin{cases} \frac{x^2}{4} + y^2 = 1 \\ y = kx - 1 \end{cases} \text{ 得: } (4k^2 + 1)x^2 - 8kx = 0$$

$$\therefore x_2 = \frac{8k}{4k^2 + 1}$$

$$\therefore y_2 = k \frac{8k}{4k^2 + 1} - 1 = \frac{4k^2 - 1}{4k^2 + 1}$$

$$\therefore E\left(\frac{8k}{4k^2+1}, \frac{4k^2-1}{4k^2+1}\right) \dots \dots \dots \quad (9 \text{ 分})$$

法 1：

$$\begin{aligned}
S &= \frac{1}{2} |OD| \cdot |OE| \cdot \sin \angle DOE = \frac{1}{2} |OD| \cdot |OE| \cdot \sqrt{1 - \left(\frac{\overrightarrow{OD} \cdot \overrightarrow{OE}}{|OD| \cdot |OE|} \right)^2} = \frac{1}{2} \sqrt{|OD|^2 \cdot |OE|^2 - (\overrightarrow{OD} \cdot \overrightarrow{OE})^2} \\
&= \frac{1}{2} \sqrt{(x_1^2 + y_1^2)(x_2^2 + y_2^2) - (x_1 x_2 + y_1 y_2)^2} = \frac{1}{2} \sqrt{x_1^2 y_2^2 + x_2^2 y_1^2 - 2x_1 x_2 y_1 y_2} = \frac{1}{2} |x_1 y_2 - x_2 y_1| \\
&= \frac{1}{2} \left| \frac{2(1-4k^2)}{4k^2+1} \cdot \frac{4k^2-1}{4k^2+1} - \frac{8k}{4k^2+1} \cdot \frac{4k}{4k^2+1} \right| = \frac{1}{2} \left| \frac{2(4k^2-1)^2 + 32k^2}{(4k^2+1)^2} \right| = \frac{(4k^2-1)^2 + 16k^2}{(4k^2+1)^2} \\
&= \frac{(4k^2+1)^2}{(4k^2+1)^2} \\
&\equiv 1
\end{aligned}$$

$\therefore S$ 为定值1 (12分)

法2: DE的方程为: $y - y_1 = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2}(x - x_1)$, 即 $(y_1 - y_2)x - (x_1 - x_2)y + x_1y_2 - x_2y_1 = 0$

$\therefore O$ 到 DE 的距离为

$$d = \frac{|x_1y_2 - x_2y_1|}{\sqrt{(y_1 - y_2)^2 + (x_1 - x_2)^2}} = \frac{|x_1y_2 - x_2y_1|}{|DE|}$$

$$\therefore S = \frac{1}{2} \cdot d \cdot |DE| = \frac{1}{2} |x_1y_2 - x_2y_1|$$

后同

21. 解: (1).当 $a = 0$ 时, $f(x) = x \sin x + \cos x$, $f'(x) = x \cos x$

由 $f'(x) = 0$ 得: $x = -\frac{\pi}{2}$ 或 $\frac{\pi}{2}$ (2 分)

列表：

x	$\left[-\pi, -\frac{\pi}{2}\right)$	$-\frac{\pi}{2}$	$\left(-\frac{\pi}{2}, 0\right)$	0	$\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$	$\frac{\pi}{2}$	$\left(\frac{\pi}{2}, \pi\right]$
$f'(x)$	+	0	-	0	+	0	-
$f(x)$		极大		极小		极大	

$\therefore f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上有 2 个极大值: $f(-\frac{\pi}{2}) = f(\frac{\pi}{2}) = \frac{\pi}{2}$ (5 分)

$f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上有1个极小值: $f(0) = 1$

(2). 由 $h(x) = \max\{f(x), g(x)\}$ 知: $h(x) \geq g(x)$

(i) 当 $x \in (\pi, +\infty)$ 时, $g(x) > 0$

$\therefore h(x) > 0$, 故 $h(x)$ 在 $(\pi, +\infty)$ 上无零点. (6 分)

(ii) 当 $x = \pi$ 时, $g(\pi) = 0, f(\pi) = -1 + \frac{\pi^2}{2}a$.

故当 $f(\pi) \leq 0$ 时, 即 $a \leq \frac{2}{\pi^2}$ 时, $h(\pi) = 0, x = \pi$ 是 $h(x)$ 的零点.

当 $f(\pi) > 0$ 时, 即 $a > \frac{2}{\pi^2}$ 时, $h(\pi) = f(\pi) > 0, x = \pi$ 不是 $h(x)$ 的零点. (7 分)

(iii) 当 $x \in (0, \pi)$ 时, $g(x) < 0$.

故 $h(x)$ 在 $(0, \pi)$ 的零点就是 $f(x)$ 在 $(0, \pi)$ 的零点.

$$f'(x) = x(a + \cos x), f(0) = 1$$

① 当 $a \leq -1$ 时, $a + \cos x \leq 0$, 故 $x \in (0, \pi)$ 时, $f'(x) \leq 0, f(x)$ 在 $(0, \pi)$ 是减函数

结合 $f(0) = 1, f(\pi) = -1 + \frac{\pi^2}{2}a < 0$ 可知, $f(x)$ 在 $(0, \pi)$ 有一个零点

故 $h(x)$ 在 $(0, \pi)$ 上有 1 个零点

② 当 $a \geq 1$ 时, $a + \cos x \geq 0$, 故 $x \in (0, \pi)$ 时, $f'(x) \geq 0, f(x)$ 在 $(0, \pi)$ 是增函数

结合 $f(0) = 1$ 可知, $f(x)$ 在 $(0, \pi)$ 无零点

故 $h(x)$ 在 $(0, \pi)$ 上无零点

③ 当 $a \in (-1, 1)$ 时, $\exists x_0 \in (0, \pi)$, 使得 $x \in (0, x_0)$ 时, $f'(x) > 0, f(x)$ 在 $(0, x_0)$ 是增函数;

$x \in (x_0, \pi)$ 时, $f'(x) < 0, f(x)$ 在 (x_0, π) 是减函数;

由 $f(0) = 1$ 知: $f(x_0) > 0$.

当 $f(\pi) = -1 + \frac{\pi^2}{2}a \geq 0$, 即 $\frac{2}{\pi^2} \leq a < 1$ 时, $f(x)$ 在 $(0, \pi)$ 上无零点

故 $h(x)$ 在 $(0, \pi)$ 上无零点.

当 $f(\pi) = -1 + \frac{\pi^2}{2}a < 0$, 即 $-1 < a < -\frac{2}{\pi^2}$ 时, $f(x)$ 在 $(0, \pi)$ 上有 1 个零点

故 $h(x)$ 在 $(0, \pi)$ 上有 1 个零点.

.... (11 分)

综上所述: $a < \frac{2}{\pi^2}$ 时, $h(x)$ 有 2 个零点;

$a = \frac{2}{\pi^2}$ 时, $h(x)$ 有 1 个零点;

.... (12 分)

$a > \frac{2}{\pi^2}$ 时, $h(x)$ 无零点;

(二) 选考题: 共 10 分.请考生在第 22、23 两题中任选一题作答.如果多做, 则按所做的第一题计分.

22.解: (1) C_1 的直角坐标方程为 $x + y - 4 = 0$ (2分)

$$(2) \text{ 直线 } l \text{ 的参数方程为} \begin{cases} x = 2 + \frac{\sqrt{2}}{2}t \\ y = 2 + \frac{\sqrt{2}}{2}t \end{cases} \quad (t \text{ 为参数})$$

将 $\begin{cases} x = 2 + \frac{\sqrt{2}}{2}t \\ y = 2 + \frac{\sqrt{2}}{2}t \end{cases}$ (t为参数) 代入 $(x-2)^2 + (y-1)^2 = 9$ 得: $t^2 + \sqrt{2}t - 8 = 0$ (7分)

显然 $\Delta > 0$ ，设点 A,B 在直线 l 上对应的参数分别为 t_1, t_2 ，则

$$t_1 + t_2 = -\sqrt{2}, \quad t_1 \cdot t_2 = -8 < 0$$

$\therefore \overrightarrow{MA}$ 与 \overrightarrow{MB} 的夹角为 π

$$23. \text{解:} (1) \text{由 } f(x) = |x-1| + |x-3| = \begin{cases} -2x+4, & x < 1 \\ 2, & 1 \leq x \leq 3 \\ 2x-4, & x > 3 \end{cases}$$

得函数 $f(x)$ 图像如右图所示,

$$\therefore f(0) = f(4) = 4$$

所以 $2 < m < 4$ (5分)

(2)由 $f(x)$ 图像可知：其图像关于 $x = 2$ 对称，

$$\text{故 } a+b=4$$

$$\therefore (\sqrt{a} + \sqrt{5b})^2 = (1 \cdot \sqrt{a} + \sqrt{5} \cdot \sqrt{b})^2 \leq [1^2 + (\sqrt{5})^2] [(\sqrt{a})^2 + (\sqrt{b})^2] = 6(a+b) = 24$$

$\therefore \sqrt{a} + \sqrt{5b} \leq 2\sqrt{6}$, 当且仅当 $\frac{\sqrt{a}}{1} = \frac{\sqrt{b}}{\sqrt{5}}$, 即 $a = \frac{2}{3}, b = \frac{10}{3}$ 时等号成立.

$\therefore \sqrt{a} + \sqrt{5b}$ 的最大值为 $2\sqrt{6}$ (10 分)

官方微博公众号 : jh985211

客服微信 : 18117901643



锦宏教育
Jinhong Education